


**Aus dem Institut für gerichtliche und soziale Medizin
der Universität Bonn**

Direktor: Professor Dr. Pietrusky.

**Die Gefährlichkeit
der Schädlingsbekämpfungsmittel
für den Menschen.**



INAUGURAL-DISSERTATION

zur

Erlangung der Doktorwürde

der Höhen Medizinischen Fakultät der
Rheinischen Friedrich Wilhelms-Universität

zu Bonn.

Vorgelegt am 28. Oktober 1936

von

Leo Bellefontaine

aus Weismes.

Bonn 1937

Anton Brand, Bonn

Gedruckt
mit Genehmigung der medizinischen Fakultät
der Universität Bonn.

Referent: Dozent Dr. Esser.

Korreferent: Prof. Dr. Pietrusky.



Die Gefährlichkeit der Schädlingsbekämpfungsmittel für den Menschen.

Die Gefährlichkeit der Schädlingsbekämpfungsmittel für den Menschen ist zweifelsohne unterschätzt worden.

Es handelt sich im wesentlichen um Nicotin, Thallium, Barium, Blausäure, Arsen, Schwefeldioxyd, Strychnin und Äthylenoxyd, die heute im Kampf gegen die Schädlinge Verwendung finden. Erst neuerdings haben E f f e r und K ü h n für das Nicotin die erhebliche Gefahrenquelle erwiesen, welche dieses Mittel bei seiner Anwendung in der Schädlingsbekämpfung darstellt. Sehr beachtlich ist dabei die Feststellung, daß von 40 Nicotinvergiftungen nicht weniger als 17 bei der Schädlingsbekämpfung, bzw. als mittelbare oder unmittelbare Folge zustande gekommen sind, und daß mit der Einführung des Nicotins in die Schädlingsbekämpfung (etwa 1922) die akuten Nicotinvergiftungen an Zahl einwandfrei zugenommen haben.

Angeichts dieser Häufung der Vergiftungen mit vorgenanntem Vertilgungsmittel, erscheint es zweckmäßig eine Zusammenstellung möglichst vieler bekannten Fälle vorzunehmen, wo irgendein als Schädlingsmittel benutzter Stoff bei seiner zu diesem Zweck erfolgten Anwendung, Erkrankung oder Tod veranlaßt hat.

Außerdem sollen die Beobachtungen zusammengestellt werden, wo ein ausgesprochenes Schädlingsbekämpfungsmittel Veranlassung zu verbrecherischer oder fahrlässiger Vergiftung wurde.

Eine Zusammenstellung dieser Intoxikationen rechtfertigt sich um so mehr, als damit dem Gerichtsarzt in größerem Maße Anhaltspunkte und Handhaben für ein etwaiges Vorgehen gegen die leichtsinnige Herstellung und Verwendung der Schädlingsbekämpfungsmittel gegeben sind.

I. Nicotin.

Das Nicotin, $C_{10}H_{14}N_2$ ist als Hauptalkaloid ein Bestandteil des Tabaks. Nicotin ist α -Pyridyl- β -tetrahydro- γ -Methylpyrrol, eine farblose, an der Luft durch Verharzung braun werdende Flüssigkeit von eigenartigem Geruch und brennendem Geschmack, die bei $246-247^\circ \text{C}$ siedet (Gadamer).

Tödliche Dosis 0,06 g (Kobert).

Die Symptome einer akuten Nicotinvergiftung bestehen in Reizungen und späteren Lähmungserscheinungen an den verschiedenen Partien des Nervensystems (Fehlen der Sehnenreflexe!), Brennen im Hals, Mattigkeit, Übelkeit, Salivation, Schweißausbruch, verlangsamtem später beschleunigtem Puls, engen Pupillen, die beim Kollaps sich erweitern, vermehrter Stuhlentleerung unter Koliken und Cyanose, oft leichter Albuminurie. Bei schweren Vergiftungen tritt Bewußtseinsstörung mit klonischen und tonischen Krämpfen in der Skelettmuskulatur auf.

In der Schädlingsbekämpfung dienen die Nicotinpräparate hauptsächlich dem Winzer. Er benutzt sie zur Tilgung der Rebenfeinde wie Schmierlaus, Traubenwickler und Kräufelmilbe. Sie sind im Handel unter den verschiedensten Namen: „Hercynol“, „Parafitol“, „Exodin“, „Nicotin“, „Nico-Fume-Liquid“, „Da-Scha“, „Vomafol“, „Pflanzenwohl-Spritzlösung“ etc.

1—7 Mc Nally :

berichtet über 7 Todesfälle durch akute Nicotinvergiftungen in Amerika. Sie traten im Anschluß an die Verwendung von nicotinhaltenen Mitteln zur Insektenbekämpfung auf. Bei den 7 Fällen handelt es sich teils um Selbstmorde, teils um Verwechslungen, teils um mysteriöse Umstände. Keine näheren Angaben über die Fälle.

8. Howard :

führt 1924 gleichfalls aus Amerika eine Beobachtung an, wo der Tod unmittelbar nach Leerung einer Viertelflasche eintrat, die an-

geblich Schnaps, in Wirklichkeit aber konzentrierte, zur Infektenbekämpfung benutzte Lösung von Nicotinsulfat enthielt.

9. Lawes:

In Australien trank eine 46jährige Frau in suicidalen Absicht eine 40%ige Nicotinslösung, die zum Bespritzen von Obstbäumen Verwendung finden sollte. Der Tod trat in 3 Minuten ein.

10. Lami:

Ein 3jähriges Mädchen hatte versehentlich von einem nicotinhaltigen Insektenmittel getrunken und starb eine Stunde später.

11. Lewin.

Trauben, die zum Zweck der Beseitigung von Ungeziefer mit einem Tabakpräparat bespritzt waren, erzeugten nach 6 Wochen bei Menschen Erbrechen und Syncope.

12. Mayou:

Ein Farmarbeiter hatte Obstbäume mit einer Mischung von Arsen, Nicotin und Blei besprengt. Er kommt mit einer Intoxikationsamblyopie in Behandlung, die per exclusionem als auf Nicotinvergiftung beruhend angesprochen wird.

13—14 Weill, Dufourt und Delaure.

Zwei Schwestern (10 und 12 Jahre) wird die Kopfhaut wegen Ungeziefers mit einer Nicotinslösung eingerieben. Wenige Stunden später tritt eine Vergiftung auf, die nach 24 Stunden abklingt.

15. Fretwurst und Hertz.

Ein 29jähriger Gärtner versprays mit einer Obstbaumspritze eine Nicotinslösung, die er sich aus einer 96%igen Lösung durch Verdünnung 1:4 selbst hergestellt hatte. Er versprays 18 Liter dieser verdünnten Lösung in 45 Minuten. Dabei rieselt ein Teil der Lösung auf ihn herunter. 5 Minuten nach Beendigung der Arbeit, Beginn der Vergiftung.

16.—17. Regenbogen.

Ein 15jähriger Gärtnerlehrling arbeitet mit „Vomafol“ (einem mit Nicotin getränktem Stoffstreifen, der beim Anzünden Nicotin-

dämpfe entwickelt und in der Schädlingsbekämpfung gebraucht wird), als er plötzlich Schwindelgefühl und ausgeprochene Übelkeit empfindet. Im Krankenhaus konnte ein objektiver Befund nicht mehr erhoben werden.

Eine 41jährige Frau pinxelt entgegen den Vorschriften der Gebrauchsanweisung das Mittel „Da-Scha“ zur Wanzenbekämpfung in die Dielen ihres Zimmers. Plötzlich fällt die Flasche um, der Inhalt ergießt sich auf den Boden; im Zimmer entsteht sofort ein intensiver Tabaksgeruch. Die Frau erkrankt unmittelbar mit Schwindel, Übelkeit, Erbrechen, Flimmern vor den Augen und Frösteln, Erscheinungen, die sich schnell zurückbilden.

18. Hertz, A.

Akute Vergiftung eines Gärtners beim Zerstäuben einer 20%igen Nicotinlösung. Der relativ gutartige Verlauf wird dadurch erklärt, daß der Vergiftete gewohnheitsmäßiger Raucher war.

19. Knack.

Akute Vergiftung bei einem Gärtner, der eine 20%ige Nicotinlösung zwecks Wollausbekämpfung auf einen großen Buchenbaum verspritzte. Nach vier Wochen völlige Heilung.

20—23. Joos, G. u. H. J. Wolf.

Ein Gärtnerlehrling erkrankte unter typischen Zeichen einer Nicotivergiftung nach Bestreichen von Treibhauspflanzen mit „Parasitol“ (5%ige Lösung).

Drei weitere Arbeiter desselben Betriebes waren vorübergehend leicht erkrankt. Heilung trat schnell ein.

24. Effer A. u. Kühn.

Ein 32 jähriger Mann kam nachts spät nach Hause. Seine Frau hörte, wie er auf dem Bettrand sitzend, etwas schlürfte. Kurz danach stöhnte er heftig, röchelte jedoch nur kurze Zeit. Beim Aufwachen sah sie den Mann tot im Bett. Die verschluckte Flüssigkeit war eine nicotinhaltige Lösung, welche zum Bespritzen von Obstbäumen verwandt wurde.

25. F. Fretwurst, A. Hertz.

Akute Nicotinvergiftung bei einem Gärtner nach Schädlingsbekämpfung mit 20%iger Nicotinlösung. In kurzer Zeit Zurückgehen sämtlicher Erscheinungen.

26. J. Faulkner.

Ein 35jähriger Blumenhändler vergiftete sich, indem er sich auf einen mit infektentötenden Mittel „Nico Fume-Liquid“, das 40% Nicotin enthält, beschmierten Stuhl setzte. Das Mittel kam dadurch mit der Haut in Berührung und wurde resorbiert. Nach vier-tägigem Aufenthalt im Krankenhaus wurde er gesund entlassen. Als er bei der Entlassung die noch etwas feuchte Hose anzog, wiederholten sich die Vergiftungsercheinungen, sodaß er noch einmal einige Tage im Krankenhaus bleiben mußte.

27. Kratz.

Vergiftung eines Moselwinzers, der sich mit Zubereitung einer Schmierlausbekämpfungsbrühe aus Seifenwasser, Tabakextrakt und Rohnicotin beschäftigte. Er starb noch vor der Ankunft des Arztes.

II. Thallium.

Thallium ist ein dem Aluminium verwandtes Element; seine Salze sind giftig. Über die tödliche Dosis ist bislang Genaueres nicht angegeben. Für den Menschen wird angenommen, daß bei Darreichung per os etwa 0,5 g giftig und etwa 1,0 g tödlich wirken. Thalliumvergiftungen haben etwas Stereotypes. Nach einer 2—3-tägigen Latenz heftige Schmerzen in Füßen, Kniegelenken, Lenden, die wochenlang anhalten können. Dabei ist Polyneuritis mit schlaffen motorischen Lähmungen nicht selten. Seitens des Magens Schmerzen, Koliken, Sub- und Anacidität, Obstipation. Im Verlauf von drei Wochen Haarausfall. Im Blut gelegentlich Eosinophilie. Im Harn Eiweiß, im Sediment Erythrocyten und Leucocyten. Psychisch bestehen oft sonderbare Zustandsbilder: Delirien und depressive Stimmungslage. Abmagerung ist häufig. Abklingen der akuten Vergiftungen meist erst nach 7—8 Wochen.

Durch Goroncy und Berg ist eine Thalliumvergiftung beschrieben, die ganz ungewöhnlich verlief. Es handelt sich um den plötzlichen Tod eines erwachsenen Mannes.

Dieser besuchte abends eine Gastwirtschaft und trank dort mehrere Schnäpfe und einige Flaschen Bier. Er kam stark angetrunken nach Hause. Er klagte seiner Frau über Kältegefühl. Nach dem Abendessen suchte er das Bett auf und erbrach. Gegen Mittag fühlte er sich abgespannt, sodaß er die Wohnung nicht mehr verließ und sich zu Bett legte. Seine Frau bemerkte auf den Wangen erbsengroße, rötliche Flecken. Am Nachmittag des anderen Tages, fuhr er mit dem Rad in einen Nachbarort. Dort fiel er während eines Gespräches um, schlug mit dem Kopf auf einen Stuhl und verchied nach kurzem Röcheln. Das Gesicht lief kurz danach blau auf.

Vergiftungen mit Thallium sind recht häufig. Thallium wird zur Vertilgung der schädlichen Nager benutzt. Dabei wird es in Form der Zeliopräparate, als Thalliumsulfat verwandt. Besonders als Mordmittel werden die Thallium-Präparate in letzter Zeit zunehmend verwandt (Fall Vogler aus Mainz, Fall Brodeffer und Johannesberg aus Pützchen bei Bonn etc.) Im Handel findet man es unter den Namen: „Celio“, „Celiopaste“, „Celiokörner“.

1. Deutlich.

Ein 27jähriger Büroangestellter hat in suicidalen Absicht eine Schachtel Zeliokörner eingenommen. Er wurde ins Krankenhaus eingewiesen und blieb vier Wochen dort. Bei der Entlassung keinerlei Beschwerden.

2. Leinert.

Ein 18jähriges Mädchen verschluckt zu Selbstmordzwecken 1 Teelöffel Zeliokörner. 14 Tage nach der Einnahme erfolgte die Aufnahme ins Krankenhaus. Am 24. Tage wurde der Zustand erträglicher. Das Mädchen wurde mit leichten Beschwerden entlassen.

3.—4. Bihler.

Der Patient nimmt aus suicidalen Absicht eine Tube Zeliopaste, die 0,7 Thalliumsulfat enthält. Ein anderer Patient nimmt aus dem-

selben Grunde 0,75—1,0 g Thalliumsulfat in Form der Zeliokörner ein. In beiden Fällen trat Heilung ein.

5.—6. Frank.

Zwei 16—17jährige Jungen nehmen etwa eine handvoll Zeliokörner, die zur Mäusevertilgung bestimmt waren, aus „Scherz“ zu sich. Bei dem einen trat der Tod nach 10 Tagen ein, bei dem überlebenden Jungen stellten sich die üblichen Symptome ein, hernach Heilung.

7. St ü m p k e.

Ein 14jähriger Gärtnerlehrling wird vier Wochen nach einem Suicidversuch mit Rattengift (Zeliokörner) ins Krankenhaus eingeliefert. Nach kurzer Zeit Heilung.

8. H a m p e l.

Eine 43jährige Frau nimmt aus Selbstmordabsicht mit Thallium vergiftete Weizenkörner ein. Zurückgehen aller Vergiftungssymptome nach kurzer Zeit.

9. R e d l i c h , F r i t z.

Eine 21jährige Näherin nahm aus suicidalen Absicht eine Tube Rattengift „Zelio“ (10%ig). Nach fünf Wochen allmähliche Heilung.

10. K a p s , H a b e r d a.

Ein Mann wurde mit drei Tuben Zeliopaste durch seine Frau vergiftet. Er starb kurz darauf (Mord).

11. H e i n i c h e n.

Eine 35jährige Landwirtsfrau nimmt in suicidalen Absicht den Inhalt einer halben und am folgenden Tage den Inhalt einer ganzen Tube Zeliopaste zu sich. Sie wurde im Krankenhaus behandelt. Bei der Nachuntersuchung (fünf Monate nach der Vergiftung) bestand eine schlaffe Parese in beiden Beinen, sodaß die Patientin nicht selbständig stehen konnte.

12.—13. L u b e n a u.

Ein 34jähriger, kräftiger Mann verschluckt 0,75 Thalliumnitrat. Der durch diese Vergiftung hervorgerufene Zustand bessert sich nach fünf Wochen.

Ein zwei Jahre altes Kind hatte ein mit Zeliopaste bestrichenes Stück Brot gefunden, das zur Rattenvergiftung auf einem Hofe ausgelegt worden war. Es aß davon und starb innerhalb 48 Stunden.

14. Greving und Gagel.

Eine 30jährige Flaschnerwitwe unternahm zehn Tage vor ihrer Aufnahme in die Klinik einen Suicidversuch, indem sie die Hälfte einer Tube Celiopaste auf das Brot strich. Bei der Entlassung aus der Klinik bestand noch eine ausgesprochene schlaffe Lähmung der Unterschenkelmuskulatur.

15. Zinffler.

Eine Frau, die ihren 29jährigen Mann umbringen will, mischt eine halbe Tube Zeliopaste in das Essen hinein. Nach einer Woche trat der Tod ein. Die Sektion konnte eine Thalliumvergiftung nicht nachweisen. Nur das Geständnis der Mörderin brachte Klarheit.

16.—17. Heier, Hans.

Suicidversuch einer Frau mit einer Tube Celiopaste und eines Mannes mit einer Packung Zeliokörner. In beiden Fällen Heilung.

18. Adler.

Eine 21jährige Patientin verübt Selbstmordversuch mit Zeliopaste. Nach einigen Wochen wieder vollkommene Herstellung.

19. Rambar, Alwin, C.

Bei einem 19 Monate alten Mädchen, das auf Brot gestrichenes Thalliumsulfat enthaltendes Rattengift genommen hatte, traten schwere Vergiftungserrscheinungen auf. Am 11. Krankheitstage starb das Kind unter zunehmender Apathie.

20. Stein.

Eine 20jährige Patientin nimmt in selbstmörderischer Absicht eine Tube „Celio“ ein. Vergiftungserrscheinungen mit anschließender völliger Heilung.

21. Popper.

Eine ebenfalls 20 Jahre alte Patientin nimmt, wie sie erst nachträglich eingesteht, in selbstmörderischer Absicht das Rattengift

„Celio“. Sie erkrankt in typischer Weise. Nach einigen Monaten stellte sich die Patientin frei von Schmerzen wieder vor.

22. Goroncy und Berg.

Vergiftung eines 39jährigen Mannes durch ein thalliumhaltiges Rattenvertilgungsmittel, das ihm in Bier und Schnaps eingemischt wurde. Schlechtes Befinden und Tod nach drei Tagen.

23.—25. Philadelphia.

Bei einem 30- und 26jährigen Mann und einer 24jährigen Frau, die teils aus Irrtum, teils in selbstmörderischer Absicht von der Celio-paste eingenommen hatten, stellten sich Vergiftungserscheinungen ein. Heilung.

26. Mahlo.

Ein 27jähriger Diplomlandwirt nahm aus Lebensüberdruß Thallium in Form des Rattengiftes ein. Heilung nach fünf Monaten.

27.—28. E. Unfeld.

Eine 24jährige Hausangestellte nahm in selbstmörderischer Absicht einen Eßlöffel voll Zeliokörner. Nach sechs Monaten frei von Beschwerden.

Eine 29jährige Arbeiterin nahm aus Lebensüberdruß eine ganze Packung grauer Mäusegiftkörner ein. Keine näheren Angaben über den Ausgang der Vergiftung.

29. Schneider, Philipp.

Eine Privatbeamtin nahm in selbstmörderischer Absicht an zwei aufeinanderfolgenden Tagen 200 g Zeliokörner in Wasser zu sich. Die Vergiftung verursachte den Tod.

30.—32. W. Ludwig und H. Ganner.

Ein 30 Jahre alter Kraftwagenführer verzehrt den Rest einer Packung Zelioweizenkörner. Heilung.

Ein 26 Jahre alter Bautechniker erkrankte, nachdem er den Inhalt einer Tube Zeliopaste zu sich genommen hatte. Fünf Monate nach Beginn der Erkrankung noch atrophische Fußmuskeln.

Eine 27jährige Frau hatte sich zweimal den Inhalt je einer kleinen Packung Zeliokörner einverleibt. 17 Monate nach der Intoxikation deutliche Paresen an den unteren Extremitäten.

32.—33. K r s e k , H é r m a n .

Eine 48jährige Frau erhielt aus Mordabsicht in der Zeit von vier Monaten etwa $1\frac{1}{3}$ —4 Tuben Zeliopaste. Nach $4\frac{1}{2}$ Monaten trat der Tod ein.

Einem häufig betrunkenen, 40jährigen Mann wurden 1—3 Tuben Zeliopaste in Wein und Kaffee beigebracht. Er verschied nach einem Monat.

34. S m i t h , J. F e r g u s o n .

Schwere Thalliumvergiftung bei einem 7jährigen Knaben, der Thalliumacetat in einer Dosis von 8,5 mg pro kg Körpergewicht gegen Mikrosporidie erhalten hatte. Nach fünf Wochen völlige Wiederherstellung.

III. B a r i u m .

Barium wird durch Elektrolyse von Bariumchlorid gewonnen. Es ist ein weißes Metall, das an der Luft oxydiert und in Wasser schon bei gewöhnlicher Temperatur zersetzt wird. Es findet vielfach Verwendung als Ratten- und Ungeziefergift in Form des Bariumkarbonats. Bei Rübenkulturen ist es ein sehr beliebtes Mittel. Im Handel trifft man es als „Antimyon“ und „Kaps“ an.

Die für den Menschen tödliche Dosis ist im allgemeinen auf 2—5 g festgestellt.

Die Symptomatologie der Bariumvergiftung ist insofern charakteristisch, als auch hier gewisse Erscheinungen immer wiederkehren. Wolf gibt in seiner ausführlichen Arbeit folgendes Bild: nach prodromalen, abnormen Hautsensationen (bzw. im Gesicht) tritt schnell Übelkeit, Erbrechen, Durchfall ein, dann erhebliche Mattigkeit, schließlich Lähmungen, die von unten heraufsteigen, und endlich Lähmungen der Schluck- und Sprachmuskeln, Atemnot, Sprach- und Schlingstörungen bedingen.

Bei besonders großen Dosen tritt der Tod durch Herzlähmung ein.

1.—4. R e i n c k e , J. J.

Eine Familie feierte den Geburtstag des Hausvaters. Nachmittags

wurde Sandtorte herumgereicht. Nach Einnahme dieser Torte erkrankte der 68jährige Hausvater, seine Frau, die 58 Jahre alt war, deren 19jährige Tochter und ihre Freundin. Schon am Abend des gleichen Tages waren die drei letzteren fast wieder hergestellt. Am folgenden Tage erfolgte der Tod des Hausvaters. Das Mehl, mit dem der Kuchen gemacht worden war, enthielt Baryt. Mord konnte nicht nachgewiesen werden.

5. Mayrhofer und Meixner.

Ein Mann nimmt auf Rat seines Freundes Rattengift als Heilmittel gegen seinen Tripper. Nach zehn Stunden stirbt er. Es handelt sich um das Rattengift „Antimyon“.

6.—8. Fellatar.

Berichtet über einen Mord und Selbstmordversuch mit 70 g als Rattengift gekauften Bariumkarbonats. Hinzu kommt ein dritter, nicht genau beschriebener Fall von Bariumkarbonat-Vergiftung.

9.—21. Olbrycht.

Ein Mann und drei Kinder nahmen die von der Frau des ersten vergifteten Speisen zu sich. Die Kinder konnten gerettet werden. Am folgenden Tage starb der Man.

Vergiftung einer 76jährigen Frau durch ihre Tochter, die 14 Tage lang den Speisen regelmäßig Rattengift zugegeben hatte.

Eine Frau vergiftete mehrere Personen: ihren Mann, zwei Kinder und einen Diener durch Hinzufügen von Rattengift in Form des Bariumkarbonats in das Frühstück. Die drei ersteren wurden gerettet. Der Diener verschied 28 Stunden nach Einnahme des Giftes. Eine Ehefrau gibt ihrem Mann und dessen Bruder von ihrem selbstgebackenen Brot, dem sie bariumhaltiges Rattengift hinzugefügt hatte, zum Verzehren. Der Ehemann überstand die Vergiftung; sein Bruder starb 24 Stunden danach.

Eine Ehefrau vergiftet ihren Mann, nachdem ihr Zusammenleben durch Streitigkeiten unmöglich geworden war, mit Bariumkarbonat, das sie dem Abendessen zusetzt. Nach 17 Stunden erfolgte unter zunehmendem Kollaps der Tod.

Versuch einen Mann durch Bariumkarbonat zu vergiften, indem

man ihm dieses in die Buttermilch einmischte. Der Versuch ging fehl, da der Mann rechtzeitig darauf aufmerksam wurde.

21.—22. **L o r e n t z , A.**

Vergiftung eines Mannes und seiner Frau, die beide ahnungslos durch Zufall in die Speisen geratenes Bariumkarbonat eingenommen hatten. Die Frau überstand die Vergiftung. Beim Mann trat 24 Stunden nach dem Frühstück der Tod ein.

23. **P a v l i c a.**

Eine 65jährige Frau wurde von ihrer Tochter und ihrem Schwiegersohn mit Barium carbonicum dadurch vergiftet, daß daselbe durch drei Wochen dem zum Kochen verwendeten Mehl beige-mengt wurde. Die Vergiftung führte zum Tode.

24. **P u l a w s k i.**

Selbstmordversuch durch bariumhaltiges Rattengift. Keine näheren Angaben.

IV. Blaufäure.

Cyanwasserstoff, HCN , Cyanwasserstoffsäure, Blaufäure entsteht als Spaltprodukt aus manchen in Pflanzen vorkommenden Verbindungen, besonders aus dem Amygdalin, einem Glykosid, das in den bitteren Mandeln vorhanden ist.

Die kleinste letale Dosis ist etwa 0,06 g. Bei Intoxikationen mit größeren Dosen von HCN , wie es in der Schädlingsbekämpfung fast nur der Fall ist, tritt der Tod nahezu augenblicklich ein. Unter Oppressionsgefühl stürzen die Vergifteten oft mit einem Aufschrei zusammen. Äußerlich ist in diesen Fällen nur eine Cyanose feststellbar.

Die Blaufäure wird vielfach zur Ungeziefervertilgung benutzt, zwar als Gas: Zyklongas. Sie wird weiterhin bei der Raubtiervertilgung in sogenannten „indischen Giftblasen“ verwendet. Es sind Ampullen, die ca. 3,0 g HCN in Lösung enthalten.

Die als Zyklon-B verkäufliche HCN -Verbindung ist ein pulverförmiges Gemisch von HCN mit einer 1,3-fachen Menge von griesförmiger Kieselgur, das in dicht geschlossenen Blechbüchsen

enthalten ist. Als Warnstoff wird ein Reizstoff beigefügt, der aus Chlorkohlenfäureester, Chloraceton und Bromaceton besteht.

1.—2. Thomas, Seager.

Zwei Männer starben nach dem Betreten eines mit HCN durchgasten Schiffraums.

3. Bein, G. V.

Ein 56jähriger Mann betritt 2 Tage nach Durchgastung mit HCN den Keller einer Dampfmaschine. Bereits während der Arbeit wird er schwindelig und übel. Im Verlauf der nächsten Tage Zunahme der Beschwerden und Einweisung in das Krankenhaus, wo sein Zustand sich besserte.

4. Bratt.

Eine 49jährige Bedienerin atmet die aus dem Nachbarhause ausströmende Blausäure ein. Das Haus wurde entwanzt. Sie erkrankte plötzlich, jedoch nicht lebensgefährlich.

5. Schwarza cher.

berichtet von einem Fall, wo unter dem Vorwande, daß es sich um ein Abtreibungsmittel handelt, ein junger Mann versuchte das Mädchen zu bewegen, den Inhalt einer „indischen Giftblase“ zu sich zu nehmen. Sonst keine näheren Angaben.

6. H. Betke.

Ein Desinfektor nahm eine Wohnungsdurchgastung mit HCN vor, wonach starkes Übelbefinden bei ihm auftrat. Nachts sprang er plötzlich aus dem Bett und fiel tot hin. Im vorliegenden Fall handelt es sich um Verwendung von Zyklon.

7.—11. M. Milanović.

Ein 43jähriger Desinfektor wurde, nachdem er eine Wohnung mit Zyklon Blausäure durchgast hatte, bewußtlos neben der Streumasse des Zyklons aufgefunden. Seine Schutzmaske war so stark verschoben, daß das Gas ungehindert eingeatmet werden mußte. Er kam nicht mehr zu sich und starb bald.

Zwei Männer (Neffe und Onkel), die abends in eine Wohnung, die mit Zyannatrium desinfiziert worden war, heimkehrten, litten beide plötzlich an schweren Vergiftungserrscheinungen. Der Onkel

konnte durch sofortige Krankenhausbehandlung gerettet werden; der Neffe wurde tot aufgefunden.

Ein 27jähriger Diener, der, obgleich gewarnt, heimlich in eine mit Zyklon-B ausgesetzte Wohnung eintrat, starb an der darauffolgenden Intoxikation.

Ein Desinfektor goß die übriggebliebenen Gemische, die bekanntlich noch reichlich gelöste HCN enthalten, in das Wasserklosett der Wohnung aus. Zu demselben Zeitpunkte betrat ein 17jähriges Mädchen das Klosett und atmete die Klosettluft ein. Nach 15 Minuten wurde es tot aufgefunden.

12. Braffer.

Sofortiger Tod eines 3½jährigen Mädchens, das auf dem Acker ein kugelförmiges rotes Gläschen findet und in den Mund nimmt. Es enthält 47,6% HCN. Es handelt sich um eine „indische Giftblase“. Ihr Vertrieb ist heute verboten.

V. Arsen.

Das Arsen, As, ist in der Natur ziemlich verbreitet; im gediegenen Zustand kommt es vor als Scherbenkobalt und findet sich im gebundenen Zustand in sehr vielen Mineralien. Als akut tödliche Dosis kann man etwa 0,3 g ansehen. Eine Gewöhnung kann eintreten.

Arsen wird bei der Schädlingsvertilgung meist in gelöster Form aufgenommen. Es ist ein Kapillargift, das Lähmungen vor allem der Mesenterialkapillaren und somit Kollaps sowie mehrere Magen- und Darmerkrankungen hervorruft. Wird die Arsenverbindung in gelöster Form aufgenommen und in größeren Mengen, so treten bei der Vergiftung die Erscheinungen seitens des ZNS hervor. In Bewußtlosigkeit und unter Muskelkrämpfen tritt in kurzer Zeit durch Lähmung der Zentren der Tod ein.

Zur Schädlingsbekämpfung wird es in mannigfachster Form benutzt: Bald als Blei-Arsen, dann als Schweinfurtergrün (Wurmgrün) oder in Form des Kalkarsenats. Uraniagrün, Eßturmit, Aresin, Dufuran, Noprasen, Vinuran sind solche Arsenverbindungen.

1. Mackay, R., J. C. R. Buchanan u. J. Sanderson.

Es handelt sich um acht Wasserlöcher, die regelmäßig wöchentlich, drei Monate lang mit Schweinfurtergrün behandelt wurden, von deren Benutzung eine Vergiftung von 132 Leuten ausging. Der Nachweis von As brachte Klarheit diesbezüglich.

2. Kötzing.

Ein Landwirt erkrankt im Juli 1928 beim Spritzen seiner Reben mit Blei-Arten. Er hat etwa einmal drei Tage, das andere Mal zwei Tage, seine Reben damit behandelt. Als er in dieser Zeit 60—70 Pfund Getreide auf den Speicher tragen wollte, fiel er zu Boden und lag 1½ Stunde bewußtlos. Laut Gutachten soll er eine As-Vergiftung erlitten haben.

3. Pásztor, Béla.

Ein 19jähriges Mädchen nahm in Selbstmordabsicht 50 g Schweinfurtergrün mit Marmelade vermischt. Kurz nach Verzehren des Gemisches Übelkeit. Am sechsten Tage Tod.

4. Stempel.

Ein Güterbodenarbeiter erkrankte nach der Nachtschicht an einer As-Vergiftung und starb nach vier Tagen. Der Arbeiter hatte sich in einem Raum, in dem zur Rattenvertilgung arsenhaltiges Gift ausgestreut war, aufgehalten. Eine andere Giftquelle konnte nicht nachgewiesen werden.

5.—6. Pickardt, H.

Ein Arbeiter, der in einer chemischen Fabrik mit einem arsenhaltigen Stäubemittel gegen Raupenfraß, das den Namen „Meritol“ führt, hantierte, zog sich eine schwere As-Vergiftung zu, die ihn über ein Jahr arbeitsunfähig machte. Noch nach dieser Zeit war er erwerbsbeschränkt.

Ein Arbeiter war fast 30 Jahre mit dem Lösen und Verpacken von Schweinfurtergrün beschäftigt. Nach dieser Zeit traten typische Vergiftungserrscheinungen auf. Es kam zur Heilung.

7. Baader.

Ein 35jähriger Flugzeugführer warf zur Raupenbekämpfung Arsen-calciumcarbonat ab, und zwar täglich 3000—4000 kg. Dabei ent-

wickelten sich sowohl beim Einfüllen wie beim Ablassen des Giftstaubes oft erhebliche Wolken, die durch die schlecht sitzende Schutzmaske in die Nase eindringen. Er erlitt eine Vergiftung, die nach einem halben Jahr jedoch keine Beschwerden hinterließ.

8. F ü h n e r.

Vergiftung eines Landwirtschaftsgehilfen, der etwa 15 Tage lang Uraniagrün gespritzt hatte. Die erforderliche Brühe hatte er selbst hergestellt.

9. D ö r l e und K. Z i e g l e r.

Im ganzen erlitten 25 Männer zwischen 30 und 60 Jahren eine As-Vergiftung. Die Erkrankten hatten wiederholt mit arsenhaltigen Mitteln in der Schädlingsbekämpfung gearbeitet. Heilung.

10.—11. S c h r a d e r.

Ein Ehepaar erkrankte nach Teegenuß unter schweren Vergiftungserscheinungen. Es handelte sich um Einnahme von Arsen, das zur Schädlingsvertilgung benutzt wurde und verfehentlich in den Teeaufguß gelangt war.

Ein Ehegatte brachte seiner Frau 1-1½ Jahre lang wiederholt Arsen und Thallium in Speisen und Getränken bei. Dadurch wurde ein chronisches Siechtum mit tödlichem Ausgang erzielt.

VI. S t r y c h n i n.

Die Strychninvergiftung ist eine der qualvollsten Vergiftungen. Häufig kommen Vergiftungen durch Genuß von Giftweizen zur Mäuse- und Rattenvertilgung vor.

Strychnin ist in England für jedermann frei erhältlich als Ratengift (Battle's vermin killer) mit etwa 8% Strychningehalt, während in Deutschland Strychninweizen höchstens 5‰ Giftstoff enthalten darf.

Die minimale tödliche Dosis beträgt 0,03 g. Einnahme von 0,2 g wirkt sicher tödlich.

Das Vergiftungsbild entspricht dem Tetanusanfall. Nach anfänglicher Steifigkeit in den Gliedern, tritt der stärkste Krampf auf.

Die Vergifteten beugen den Kopf nach hinten, die Augen treten hervor, die Pupillen sind erweitert. Infolge des Zwerchfellkrampfes hört die Atmung auf und starke Zyanose tritt ein. Unter furchtbaren Qualen gehen die Vergifteten an der Erstickung im Krampfanfall zugrunde (Erich Lefschke).

1. L e n d o n , A l f r e d .

Mord durch Beimengung von drei Päckchen Strychnin (26 mg) in Würsten. Das Strychnin war zum Zwecke der Schädlingsbekämpfung in der Apotheke erworben worden.

Das Opfer, ein junges Mädchen, klagte ein halbe Stunde darauf über Schwindel und Kopfschmerzen. Lippen und Gesicht waren starr. Es traten krampfartige Anfälle auf. Im Krankenhaus starb das Mädchen sieben Stunden nach der Vergiftung.

2. B r i e g e r .

Das Kind aß einige Körner Giftweizen, die es auf dem Boden in einem Käftchen fand. Er starb eine halbe Stunde darauf.

3. L e i m e r t , E r n a .

Ein 18jähriges Mädchen erkrankt 14 Tage nach Einnahme eines Teelöffels voll vergifteten Mäuseweizens mit Beinbeschwerden und Magenschmerzen.

Es wurde im Krankenhaus behandelt. Bei der Entlassung, nach sechs Monaten, bestand noch Steifigkeit der Beine.

4.—6. S c h r a d e r .

Suicid einer Ehefrau mit Strychnin. nitr. Das Gift war infolge ungenügender Verwahrung der Ehefrau zugänglich gemacht worden. Giftmordversuch mit Strychninpralinen. Die Ermittlungen ergeben einen gewissen Verdacht gegen den geschiedenen Ehemann.

Ein Mann spielte seiner Frau Strychnin als Medikament gegen die Menstruationbeschwerden in die Hände, das sie sich selbst beibringen sollte. Sie tat es und starb darauf.

VII. S c h w e f e l d i o x y d .

Schwefeldioxyd SO_2 stellt in reinem Zustand ein stechend riechendes Gas dar. Es löst sich in reichlicher Menge in kaltem Wasser.

des gesamten Körpers ein. Nach 1—2 Minuten läßt der Krampf nach, tritt aber bald wieder ein.

Vergiftungen durch SO_2 sind meistens harmlos, sie verlaufen selten tödlich. Einatmung geringer Konzentrationen bewirkt Hustenreiz, Bronchitis, Konjunktivitis. Chronische SO_2 -Einwirkung ruft Erythrocytose hervor.

Das SO_2 ist das älteste und in der Schädlingsbekämpfung am weitesten verbreitete Gas. SO_2 wird gegen Kleiderläuse, deren Nisse, Flohlarven, Pferdelaufe, Kälberhaarlinge und beim Menschen gegen Krätzmilben und Kopfläusen verwandt. Außerdem hat es noch ein Anwendungsgebiet gefunden bei der Vertilgung der schädlichen Nager, mittels Gaspatronen.

1.—4. Friedrich, Fr.

Bei einer an vier Kindern vorgenommenen Kopftentlaufung mittels Gummihauben, wurden in einer Desinfektionsanstalt teils leichtere, teils schwerere Verätzungen beobachtet.

VIII. Äthylenoxyd.

Das jüngste der Gase, welche in der Schädlingsbekämpfung eine Rolle spielen, ist das Äthylenoxyd, CH_2OCH_2 . Es ist in reinem Zustand eine farblose Flüssigkeit von nicht unangenehmem Geruch. Das Gas besitzt ein außerordentlich gutes Durchdringungsvermögen.

Es findet als sog. T-Gas, Aetox, Verwendung. T-Gas ist eine Mischung von Äthylenoxyd und Kohlenäure im Verhältnis 10:1. Vergiftungen durch Äthylengas sind nicht bekannt, dagegen berichtet:

L o h m a n n, Fr.,

kurz über zwei Fälle, die sich in Stockholm ereigneten, und durch Explosionen von Äthylenoxyd zustande kamen.

An letzter Stelle sind zwei Vergiftungen durch Fliegenvertilgungsmittel erwähnenswert.

D r i n c z e.

In suicidalen Absicht trank ein Arbeiter 330 ccm von dem Infektenvertilgungsmittel „Flit“. Am nächsten Tage tritt der Tod unter

Lungenödem und Herzschwäche ein. Zu diesem Mittel hatte er noch ein wenig Laugensteinlösung gemischt.

G. Iudica - Cordiglia berichtet über einen weiteren Fall. Durch Inhalation eines flüssigen Fliegenmittels (Lösung von Methylfalcylat in Benzin), kam es bei einem 2½jährigen Kinde zu einem 12 Stunden lang dauernden Vergiftungszustand.

Eine noch größere Zahl von Vergiftungen bei der Schädlingsbekämpfung ergab sich aus dem Schrifttum nicht.

Die Feststellung A. E f f e r s und K ü h n s, daß die Vergiftungen im direkten Zusammenhang mit der vermehrten Produktion der Schädlingsvertilgungsmittel stehen, kann hier nur bestätigt werden. Ihre wahllose und erhöhte Herstellung sollte jetzt, mehr denn je, dem Arzt im Kampf gegen die Ausbreitung der Vergiftungen, Gegenstand des Interesses und seiner allergrößten Wachsamkeit sein. Da er heute sowohl in technischen Angelegenheiten auf dem Gebiete der Schädlingsbekämpfung als Beratender, wie auch bei Unglücksfällen resp. Vergiftungen, als Behandelnder beigezogen wird, ist eine Orientierung seinerseits Pflicht.

Unerläßliche Vorbedingung einer wirksamen Bekämpfung solcher Intoxikationen ist natürlich eine Verbreitung der Kenntnis des Vergiftungsbildes unter den Ärzten. Bei Einnahme oben genannter Mittel treten in den wenigsten Fällen typische Erscheinungen auf, die einen sofortigen Hinweis auf die Art der Vergiftung geben. Der Arzt steht dabei immer vor Schwierigkeiten.

Durch den Ausbau der chemischen Nachweisverfahren sind wir erheblich weitergekommen. Es handelt sich dabei jedoch um Spezialmethoden, die nur dem Gerichtschemiker geläufig sind. Der praktische Arzt hat zumeist nur geringe Kenntnis von diesen Dingen, wird auch oft genug gar nicht oder erst kurz vor dem Tode des Erkrankten zugezogen und kann sich infolgedessen häufig genug über die Art des zugrunde liegenden Leidens kein klares Bild machen. Um so wesentlicher ist es aber, daß der Totenschein sich über diese diagnostischen Unklarheiten eindeutig ausdrückt und nicht durch die leider so häufige Diagnose: „Herzschlag“ ufw. die Aufdeckung eines Verbrechens oder Unfalles verhindert.

Sind uns doch 90 solcher Intoxikationen bekannt — bei Hinzuzählung der Massenvergiftungen sind es über 220 Fälle — wovon nicht weniger als 44 tödlich verliefen.

Erst seit 1920 wird die Schädlingsbekämpfung von den Ärzten als ernste Gefährdung für den Menschen dargestellt und vor den zu diesem Zweck benutzten Mitteln gewarnt.

Wenn auch heute in wissenschaftlicher Hinsicht die Grundlagen auf diesem Gebiete in großen Zügen gesichert sind, fordert doch der weitere Ausbau der Methoden das Zusammenwirken aller einschlägigen biologischen, chemischen, technischen, ärztlichen und amtlichen Kreise.

Die Anwendung der Schädlingsbekämpfungsmittel geht in Deutschland ungefähr auf 25 bis 30 Jahre zurück. Die hohe Bedeutung dieser durch den Krieg und seine Folgen allgemeiner gewordenen Mittel, ist nicht in Abrede zu stellen, und über ihre Unentbehrlichkeit besteht in einem heutigen Kulturstaat kein Zweifel mehr. Die Vertilgung der Schädlinge, ob Nager, ob Ungeziefer, bedeutet in volkswirtschaftlicher und hygienischer Hinsicht eine Wohltat für Millionen von Menschen.

Die Tatsache, daß Ratten — von ihrer verderblichen Nager-tätigkeit ganz abgesehen — die Überträger von mehreren Krankheiten sind, die Kleiderlaus die Überträgerin des Fleckfiebers, daß andere infektizide Schädlinge imstande sind kostbares Volksgut, wie Nahrungsmittel und Weinbergernten zu vernichten, genügt, um einen rücksichtslosen Kampf gegen sie zu führen.

Bedauerlich ist nur, daß die Schädlingsbekämpfung als indirekte oder direkte Folge für den Menschen manche Vergiftungen, öfter tödliche Vergiftungen, zeitigt. Dem Schrifttum ist zu entnehmen, daß Intoxikationen mit Thallium- und Bariumpräparaten, welche meistens zu suicidalen und kriminellen Zwecken dienen, an Häufigkeit im Laufe der letzten fünf Jahre zugenommen haben. Die Thallium- und Bariumpräparate sind im freien Handel ohne weiteres zu erwerben und werden in den meisten Fällen, besonders von der Landbevölkerung, als Ratten- und Mäusevertilgungsmittel benutzt. Dieser Umstand macht das Thallium und das Barium forensisch be-

fonders bedeutungsvoll. Es besteht außerdem noch die Möglichkeit, daß manche kriminellen Intoxikationen übersehen werden, weil Ärzten selbst das Vergiftungsbild nicht bekannt ist.

Bisher liegen nicht viele Todesfälle durch Arsenvergiftungen vor, welche mit gewissem Recht auf die Schädlingsbekämpfung zu beziehen sind. Viele Erkrankungen sind einer Heilung zugänglich. Es ist kaum zu bezweifeln, daß jährlich sich wiederholende Schädigungen im Laufe der Zeit schwerste, irreparable, wenn nicht tödliche Gefundheitschädigungen veranlassen können. Die Vergiftungen mit Arsen und auch solche mit Nicotin als Spritzmittel, sind bei der Schädlingsbekämpfung zum größten Teil als gewerbliche Vergiftungen anzusehen und haben forensisch weniger Bedeutung. Über die kritiklose Anwendung des Nicotins und die damit verbundene Gefahr für den Menschen, berichtet A. E f f e r ausführlich in der eingangs erwähnten Arbeit.

Die toxikologische Bedeutung der Schädlingsbekämpfung liegt vor allem in der umfangreichen Verwendung von Giften überhaupt, im ausgedehnten Gebrauch solcher Stoffe in Wohnungen, in Kleinbetrieben, in der Landwirtschaft, nicht zuletzt aber in der Handhabung durch nicht kundige und ungeschickte Personen. Die Gebiete, auf denen diese Gifte besonders Anwendung finden, betreffen die Vertilgung der Haus- und Magazininsekten, die Entwesungen von Kasernen, von Verkehrsmitteln, von Eisenbahnen, Schiffen, Automobilen. Besonders zu erwähnen sind hier die nach Einlauf in den Häfen stattfindenden Schiffsdurchgäßen, die in erster Linie der Rattenvertilgung, dann auch der Beseitigung von Wanzen, Flöhen und Küchenschaben dienen. Weiterhin sind sie in Mühlen eine Maßnahme des Mehlschutzes gegen die Mehlmotten, Mehlkäfer und Kornkäfer. Außer für die Zwecke der Bekämpfung genannter Schädlinge finden wir sie in weiter Verwendung auch im Dienste des Pflanzenschutzes. Die Zusammensetzung und die Gefahren dieser Gifte sind vielfach unbekannt. Ihre Gefahr wird durch Verwendung in Gas-Dampf-Nebel-Staubform erhöht. Es kommt dabei zur Gefährdung der Hersteller, der Verwender, der Umgebung, schließlich zu mancherlei Gefahren durch den Genuß be-

handelter Produkte und Materialien z. B. Gemüse, Obst, Wein, Mehl und Brot.

Alle diese Stoffe kommen bei den verschiedenen Verwendungsverfahren in die Atmungsluft der die Schädlingsbekämpfung ausführenden Arbeiter, ganz gleich, ob es sich um Gasegifte handelt oder um fest verstäubte chemische Stoffe, die auf Insekten durch Kontakt wirken, die die Tracheen der Insekten verstopfen, oder ob es sich um Gifte handelt, die von den Parasiten gefressen werden müssen (Fraßgifte).

Als das beste infektizide Mittel wird Äthylenoxyd empfohlen. Es ist giftiger, wirksamer gegen Insekten, dabei weniger toxisch, wenn auch nicht ungefährlich, für den Menschen. Für den Menschen ganz ungiftige Stoffe, die für Parasiten und Schädlinge in kurzer Zeit giftig sind, gibt es natürlich nicht. Sehr viele Schädlinge, insbesondere Insektengruppen sind spezifisch empfindlich, nur müßten die giftigen Stoffe besonders ausgefucht werden mit maximaler spezifischer Giftigkeit für die Parasiten, geringer Giftigkeit für den Menschen.

Auf die Gefahr gasförmiger Entwesungsmittel muß wegen der Restgase noch hingewiesen werden. Bei der Durchgasung selbst, wird, bei Einhaltung aller gesetzlich vorgeschriebenen Vorsichtsmaßregeln, die hochgiftige Eigenschaft dieser Stoffe weniger gefährlich sein. Die mancherlei Vergiftungen, die freilich zu der großen Zahl der durchgeführten Durchgasungen als gering bezeichnet werden müssen, traten nach der Nachprüfung K. B. Lehmanns zumeist nicht im Stadium der Durchgasung auf, sondern müssen zurückgeführt werden auf unglückliche Begleitumstände nach der Durchgasung.

Manche Stoffe wie Polster und Matratzen, Roßhaar, Flanell und Stroh nehmen bei der Durchgasung relativ viel Gase auf. So trifft dies für die Blausäure und Äthylenoxyd zu, wobei besonders feuchtes Material bereit ist, mehr von diesen Gasen als trockenes zu absorbieren. Geradezu erstaunlich ist es, wie lange solche Stoffe die Gasmengen in sich zurückhalten, und wie schwer es ist, diese Spuren aus den Stoffen wieder herauszubringen. Auch Bücher und

Akten halten diese Gase zurück. Diesen Gefahren begegnet man dadurch, daß nach der vorgeschriebenen Lüftung die noch vorhandene Gase durch den „Gasrestnachweis“ festgestellt werden. Dieser Nachweis muß nicht nur in allen durchgasteten Räumen, sondern gegebenenfalls auch in den nicht durchgasteten, benachbarten Räumen vorgenommen werden. Die hohe Giftigkeit der gasförmigen Entwesungsmittel für den Menschen, bedingte eine gesetzliche Regelung der Gasanwendung als Schädlingsbekämpfungsmittel. Für Deutschland ist ihre Anwendung durch „Reichsverordnungen über die Schädlingsbekämpfung mit hochgiftigen Stoffen“ ferner durch Rundschreiben des Reichsministers für Ernährungs- und Landwirtschaft, sowie durch die Ausführungsbestimmungen der einzelnen Länderregierungen geregelt.

Die Anwendung dieser Mittel auf dem Gebiete der Schädlingsbekämpfung ist nur besonders konzeffionierten Stellen oder Personen gestattet, deren Anzahl möglichst beschränkt zu halten ist. Ferner den zuständigen Organen der Heeres- und Marineverwaltung sowie den Forschungsanstalten des Reiches.

Die Ausbildung in der Anwendung dieser Stoffe muß, laut Reichsverordnung, durch Ablegung einer Prüfung nachgewiesen werden. Verantwortlich für die Ausführung der Durchgasungen sind die Durchgasungsleiter, der Inhaber der Erlaubnis und seine Geschäftsführer.

Beim Hantieren mit Äthylenoxyd ist es, den behördlichen Vorschriften gemäß, streng verboten mit brennender Zigarre, mit funkgebender Taschenlampe, mit brennender Laterne usw. zu arbeiten. Es dürfen die Ofenfeuerungen oder die elektrische Heizung bei Beginn der Durchgasung nicht mehr in Tätigkeit sein.

Die praktische Bedeutung des Äthylenoxyds ist eine große. Wenn auch für den Menschen giftig, steht es doch weit hinter der Giftigkeit der Blausäure zurück. Dabei ist es der Blausäure im Endeffekt ebenbürtig und besitzt andererseits nicht die Nachteile des Schwefeldioxyds.

Das T-Gas hat sich deshalb bei der Schädlingsbekämpfung gut eingeführt und darf wohl als ein sehr ausichtsreiches, gasförmiges Schädlingsbekämpfungsmittel überhaupt bezeichnet werden.

Zu Ende meiner Ausführungen sei auf einige Punkte, die zur teilweisen Behebung der Gefährlichkeit der Schädlingsbekämpfungsmittel beitragen könnten, zusammenfassend hingewiesen. Bei der Schädlingsbekämpfung der Insekten empfiehlt Brügmann das Sagrotan (Kombination von Chlor, Krefol, Chlorxylenol), weil es die Forderungen, die an ein gutes Entwesungsmittel gestellt werden müssen, erfüllt: unbedingt sichere Wirksamkeit, Ungiftigkeit und Unschädlichkeit für den Menschen.

Warnende Reizgase, die geeignet sind eine giftgefährliche Luft beim Betreten eines Raumes den Sinnen zu verraten, sollten obligatorisch allen flüchtigen Stoffen beigegeben werden.

Flury und Zernik machen auf verschiedene vor Durchgasungen zu treffende Vorichtsmaßregeln aufmerksam:

1. Genaue Berechnung des Rauminhalts des zu durchgasenden Raumes.
2. Überzeugung, daß sämtliche Fenster, Türen, Klappen und sonstige Öffnungen dicht verschlossen sind.
3. Vermeidung von Durchgasungen bei heißer Luft.
5. Genaues Abwägen der erforderlichen Menge des gas-, dampf- oder staubförmigen Mittels.
6. Entfernung von Feuchtigkeit.

Sorgfältige Durchführung des „Gasreftnachweises“ darf nach Durchgasungen nie unterbleiben, ebenso nie die Beseitigung eines funken- oder flammgebenden Gegenstandes vor Durchgasungen mit Äthylenoxyd.

Es erscheint notwendig, die mit der Vertilgung betrauten Personen über die möglichen Schädigungen aufzuklären und sie in allen Fällen mit den zweckdienlichen Schutzmitteln, Handschuhe und Masken zu versehen.

In der Ratten- und Mäusebekämpfung empfiehlt A. L o i r eine intensivere Mithilfe der Katzen ergänzend einzuschalten. Bestimmte Katzenrassen eignen sich besser zum Rattenfang. Mit Fallen und Giftködern werden meist nur die Männchen erfaßt, weil sich die Weibchen der Aufzucht des Nachwuchses hingeben.

Für Neubauten müssen Vorschriften für eine rattendichte Bauweise Aufnahme finden.

Die blind endenden, nicht mehr benutzten Hausziele, die den Ratten beliebte Niststätten bieten, sollen planmäßig beseitigt werden.

Auf die sog. „Rattengroßkampftage“ — eine an sich sehr gute Einrichtung — muß mehr Wert gelegt werden.

Verstärkte Kontrolle muß über die gesetzwidrige Aushändigung (d. h. Verabfolgung von Giften ohne Giftschein und außerhalb konzessionierter Geschäfte) der Schädlingsbekämpfungsmittel gehalten werden.

Ferner kann nicht genug auf die vorsichtigste Aufhebung der nicotin-, thallium-, barium- und arsenhaltigen Mittel nach deren Benutzung aufmerksam gemacht werden.

Aufgabe der chemischen Industrie ist es, neue ungefährliche Mittel zur Bekämpfung der Schädlinge ausfindig zu machen.

Ein Herstellungsverbot würde für solche Unternehmungen angebracht sein, die durch unsinnige Reklame auf die Gefährlichkeit der Mittel für den Menschen nicht hinweisen.

Nicht zuletzt sollte jeder Arzt es als Pflicht betrachten, sich auf dem Gebiete der Schädlingsbekämpfung und ihrer Gefahren genauestens zu orientieren. Dies um so mehr, als ihm hier wiederum Gelegenheit geboten wird, mit ganzen Kräften für das Wohlergehen von Mensch und Volk zu forgen.

Literaturverzeichnis.

- Adler: Derm. Zt. 63, 259 (1932).
Baader: Sammlg. Verg.-Fällen, A 47 (1930).
Bein: Zeitschr. gerichtliche Med. 5, 457.
Betke: Sammlung. Verg.-Fällen, A 105 (1932).
Bihler: Verg.-Fällen, 3, 93 (1932).
Brieger: Dtsch. Z. gerichtl. Med. 10, 634 (1927).
Bratt: Sammlg. Verg.-Fällen, A 159 (1930).
Deutich: Klin. Woch. 2052 (1929).
Dörle: Sammlg. Verg.-Fällen, A 48 (1935).
Effer u. Kühn: Sammlg. Verg.-F. 4, C II (1933). Die tödlichen Nikotinvergiftungen und ihre Zunahme seit Einführung nikotinhaltiger Schädlingsbekämpfungsmittel.
Fellatar: zit. nach Mayrhofer u. Meixner.
Flury-Zernik: Schädliche Gase.
Frank: Zt. ärztl. Fortbildg. 28, 122 (1931).
Fretwurst u. Hertz: Z. klin. Med. 122, 641 (1932).
Frickhinger: Gase in der Schädlingsbekämpfung.
Fühner: Sammlg. Verg.-F. 2, B 25, 59 (1931).
Goroncy u. Berg: Sammlg. Verg.-F. A 227 (1933).
Greving u. Gagel: Kl. Woch. Nr. 28(1928) u. Zt. Neur. 120, 805 (1929).
Hampel: Klin. Woch. 396 (1932).
Heier: Inaugural-Dissertation. Bonn 1931.
Heinichen: Sammlg. Verg.-F. 2, A 27 (1931).
Hertz: Sammlg. Verg.-F. A 297, 305 (1932).
Howard: Ref. Zeitschr. gerichtl. Med. 4, 500.
Incze: Sammlg. Verg.-F. A 495, 77.
Joos u. Wolf: Sammlg. Verg.-F. A 521, 137 (1935).
Judica-Cordiglia: Sammlg. Verg.-Fällen, A 187, 21, (1932).
Kaps-Haberda: Wien. klin. Woch. 396 (1932).
Knack: Dtsche. med. Woch. 1467 (1932).
Kötzing: Sammlg. Verg.-F. B 54 (1935).
Kratz: Münch. med. Wochschr. 19 (1935).
Krsek: Ref. dtsh. gerichtl. Med. 223, 115 (1934).
Lami: Die wichtigsten Vergiftungen. München, Lehmann 1933.
Lawes: Ref. Z. gerichtl. Med. 12, 18.
Leimert: Münch. med. Woch. 1930 (1930).

- London: Ztschr. gerichtl. Med. 9, 778.
Lefschke: Die wichtigsten Vergiftungen S. 28 München 1933.
Lubenau: Zt. Med. Beam. 106 (1928).
Ludwig u. Ganner: Dtsch. Arch. Klin. Med. 176, 188 (1934).
Mahlo: Med. Klinik 69 (1934).
Milanovic: Sammlg. Verg.-F. A 455, 171 (1934).
Mayrhofer u. Meixner: Wien. Klin. Wschr. 1068 (1910).
Nally: Ref. Z. gerichtl. Med. 2, 709.
Olbrycht: Dtsch. Z. gerichtl. Med. 4, 258 (1942).
Pavlika: Ref. Dtsch. Z. gerichtl. Med. 18, 189 (1932).
Pickardt: Gewerbliche Arsenstaubvergiftungen, Inaugural-Diss. 1930.
Philadelphia: Münch. Med. Woch. 1362 (1934).
Popper: Hlinik u. Ther. ak. Vergiftungen S. 77 Leipzig 1933.
Pulawski: Zt. ärztl. Fortbildg. 9, 69 (1924).
Rambar: Ref. Zt. ger. Med. 20, 33 (1933).
Redlich: Wien. Klin. Wochschr. 694 (1927).
Regenbogen: Sammlg. Verg.-F. A 276, 219 (1932).
Reinke: Vjschr. ger. Med. 28, 248 (1878).
Schrader: Sammlg. Verg.-F. 4, B 35, 19 (1933).
Schneider: Beitr. ger. Med. 7, 10 (1928); 13, 122 (1935).
Smith: Ref. Dtsch. Z. ger. Med. 18, 189 (1932).
Stein: Med. Klin. 1181 (1928).
Stümpke: Derm. Zt. 58, 10 (1930).
Schwarzacher: Beitr. ger. Med. 11, 48 (1931).
Thomas: Zeitschr. ger. Med. 3, 286.
Unfeld: Med. Welt 487, 1935.
Weill Dufourt u. Delaure: Ref. Z. ger. Med. 4, 395.
Werner: Sammlg. Verg.-F. 3, A 93 (1932).
Zangger: Die Gaschutzfrage.
Zinffer: Münch. med. Wochschr. 1494 (1927).
-

Lebenslauf.

Am 19. April 1911, wurde ich, Leo Bellefontaine als Sohn des Auktionators Nestor Bellefontaine und seiner Ehefrau Viktorine geb. Dehottay in Weismes (Kr. Malmedy) geboren. Zunächst besuchte ich die Volksschule zu Weismes und dann von 1923 ab das königliche Gymnasium in Malmedy, wofelbst ich im Juli 1930 meine Reifeprüfung ablegte. Hiernach studierte ich Medizin in Bonn, Innsbruck und Düsseldorf. Mein Physikum bestand ich Ende des Wintersemesters 1932/33 in Bonn und das medizinische Staatsexamen am 3. Oktober 1936 auch in Bonn.
